

# Birdup-Biotic


Birdup-Biotic aus dem Hause Birdsandmore Hungenberg ist ein spezieller Darmkonditioner für Vögel mit prebiotischer Wirkung auf die Darmflora. Birdup-Biotic basiert auf speziell aufgearbeitete Frucht-Oligosaccharide in Verbindung mit Elektrolyten. Birdup-Biotic sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine Stabilisierung der Darmflora durch direkte Anbindung von Krankheitskeimen (speziell E.Coli), dem Aufbau eines Schutzfilms auf der Darmschleimhaut und der Sicherstellung einer optimalen Verdauung und Kotkonsistenz. Die Ursache allgemeiner Darmstörungen findet sich meistens in einer gestörten Darmflora, zumindest resultiert aber aus Darmstörungen ein empfindlicher Eingriff in das biologische Gleichgewicht der Darmflora, wodurch der nötige PH-Wert und die reibungslose optimale Verdauung nicht mehr sichergestellt sind. Birdup-Biotic sorgt bei allgemeinen Darmstörungen und speziell bei Durchfall für eine sofortige Anbindung von überschüssiger Flüssigkeit, wodurch die optimale Kotkonsistenz wieder hergestellt wird. Insbesondere regelt Birdup-Biotic den Darmdurchfluss und den Aufbau eines Schutzfilmes auf der Darmschleimhaut. Gleichzeitig versorgt Birdup-Biotic den Organismus schnell und direkt mit den fehlenden Mineralien (elektrolytische) und beugt so einem gefährlichen Defizit vor.

Die Anwendung sollte regelmäßig nach der nebenstehenden Art vollzogen werden. Eine phasenbezogene Anwendung ist speziell bei Darmstörungen und bei Nestlingen - zur Vorbeugung und Behandlung feuchter Nester - angeraten.

*Birdup-Biotic uit ten huize Birdsandmore Hungenberg is een nieuw soort speciale, darmkonditioner voor vogels ontwikkeld met prebiotische werking op de darmflora. Birdup-Biotic gebaseerd speciaal op de opgewerkte vrucht-oligosaccharide in verbinding met Elektrolyten. Birdup-Biotic zorgt bij een regelmatiger gebruik voor een stabilisering van de darmflora, door direct vestiging van ziektekieuwen (speciaal E Coli), de opbouw van een beschermlaag op het darmlijmvlies en de zekerheidsvaststelling van een optimale spijsvertering en mestconsistentie.*

*De oorzaak van de algemene darmstoornissen bevindt zich meestal in een gestoorde darmflora, althans resulteert echter uit darmstoringen een gevoelige ingreep van het biologische evenwicht van de darmflora, waardoor de nodige PH waarde en de vlotte spijsvertering niet meer zekergesteld zijn. Birdup-Biotic draagt zorg voor de algemene darmstoringen en speciaal bij diarree. Voor een onmiddellijke aanbinding van overtollige vloeistof, waardoor de optimale mestconsistentie weer hersteld wordt. In het bijzonder regelt Birdup-Biotic de darmdoorloei en de opbouw van een beschermlaag op het darmlijmvlies. Gelijktijdig herstelt Birdup-Biotic het organisme vlug en direct met de ontbrekende Mineralen (elektrolytische) en verhindert zo een gevaarlijk tekort.*

*Het gebruik moet regelmatig aan de hand van de nevenstaande soort uitgevoerd worden. Een periode trasaat toepassing is speciaal voor darmstoringen en bij de nestjongan voor verhinderen en behandeling van de natte nesten aangeraden.*



## Anwendung und Dosierung:

Allgemeine Anwendung: Regelmäßig alle zwei Wochen über 3 Tage eine Kur mit 2 Meßlöffel (ca.10g) Birdup-Biotic auf 1kg Aufzuchtfutter.

Algemeen gebruik: Regelmatig alle 2 weken gedurende 3 dagen een kuur met 2 Maatlepel (ca.10g) Birdup-Biotic op 1kg opfokvoeder.

Aufzucht/Nestlinge: 2 Meßlöffel (ca.10g) Birdup-Biotic auf 1kg Aufzuchtfutter zwischen Schlupf und 10. Lebenstag der Nestlinge. Bei feuchten Nestern - Durchfall der Nestlinge Dosierung auf 15g (3 Meßlöffel) pro 1kg Aufzuchtfutter anheben.

Kweek/nestjongan: 2 Maatlepel (ca.10g) Birdup-Biotic op 1kg opfokvoeder tussen het uitkomen en 10 levensdagen van de nestjongan.

Darmstoringen, Diarree bij de nestjongan: Dozering op 15g (3Maatlepel) per 1kg opfokvoeder aanhouden.

Stress, Umgewöhnung, Neuzugänge: 2 Meßlöffel (ca.10g) Birdup-Biotic auf 1kg Aufzuchtfutter über 3 Tage, danach zur allgemeinen Anwendung übergehen.

Stress, ontwaning, nieuwe aanwinst: 2 Maatlepel (ca.10g) Birdup-Biotic op 1kg opfok/konditievoeder gedurende 3dagen, daarna op allgemeen gebruik overgaan.

Darmstörungen, Durchfall: Täglich 3 Meßlöffel (ca.15g) Birdup-Biotic auf 1kg Aufzuchtfutter ununterbrochen verabreichen bis sich eine sichtbare Besserung einstellt.

Darmstoringen, Diarree: Dagelijks 3 Maatlepel (ca.15g) Birdup-Biotic op 1kg opfokvoeder ononderbroken toedienen tot er een zichtbare beterschap is ontstaan.

Die Dosierung kann bei speziellen Vogelarten auch über Obst oder bei Brieftauben über das Körnerfutter (Anbindung mit Öl) stattfinden. Birdup-Biotic ist kurzfristig wasserlöslich und kann daher nur beschränkt über das Trinkwasser verabreicht werden. Hierbei ist jedoch die Dosierung zu halbieren. Eine schädigende Überdosierung, sowie Nebenwirkungen sind nicht möglich!!

De dosering kan voor speciale vogelsoorten ook via fruit of bij briefduiven via het graanvoeder (toepassen met olie) aangeboden worden. Hierbij is echter nodig om de dosering te halveren. Een besschadende overdosis, zoals nevenwerkingen zijn niet mogelijk!!

Meßlöffel-groß - Maatlepel-groot - 5ml  
10g entsprechen 2 große Meßlöffel  
10g stemt overeen met 2 grote maatlepels

*Birds and more  Hungenberg*  
[www.birdsandmore.de](http://www.birdsandmore.de)